

健康テーマ

血 圧



源氣レシピ

イオンの登録販売者×管理栄養士が健康をお届け！

投稿日：2023/10/01

さつまいもとわかめの炊き込みご飯



主食

血圧

血管年齢

便秘

材料(2食分)

白米	1合	A) 料理酒	小さじ1
さつまいも	150g	A) みりん	小さじ1
カットわかめ	小さじ2	ごま塩	少々

①塩分はあとがけ

ご飯自体に醤油などで味付けをせずに、食べる時にごま塩などをかけて味付けすることで上手に減塩することができます。

②食物繊維が脂質・糖・塩分を排出

さつまいもとわかめは食物繊維が豊富な食材です。食物繊維には便通を整えて便秘を防いだり、脂質・糖・塩分（ナトリウム）などを吸着して身体の外に排出する働きがあります。


栄養成分(1食分)

エネルギー	381kcal	炭水化物	88.8g	塩分	0.5g
たんぱく質	5.8g	（糖質	85.9g）	カリウム	360mg
脂質	1.3g	食物繊維	2.9g		

作り方

1

さつまいもは2cm角に切り、水に10分程さらす。




2

炊飯器に研いだ米とAを入れ、水を米1合の目盛りまで入れる。



3

炊飯器にさつまいもとわかめを入れて普通の炊飯モードで炊く。



4

炊けたらお皿に盛って、ごま塩をかけて完成。



※アレルギーや持病がある方は、かかりつけ医の指導を優先してください。※栄養価計算は、日本食品標準成分表2020年版(八訂)より算出しております。記載のない食品は概算値で計算しております。※調理の際は、怪我や火傷等に十分に注意してください。※健康ポイントの文章は、厚生労働省eヘルスネットより引用しております。



大正製薬 大正Livita
生活習慣が気になり始めた方の健康緑茶

機能性表示食品 [届出番号：K106]

【機能性表示】本品には、難消化性デキストリン（食物繊維）およびヒハツ由来ピペリンが含まれます。難消化性デキストリン（食物繊維）には、食後血糖値の上昇を抑制する機能があることが報告されています。また、食後血中中性脂肪値の上昇を抑制する機能があることが報告されています。さらに、おなかの調子を整える機能があることが報告されています。ヒハツ由来ピペリンには、血圧が高めの方の血圧を下げ、正常な血圧を維持する機能があることが報告されています。○本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。○食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。○本品は医薬品と異なり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

高めの血圧※が気になる方におすすめ

※「高めの血圧」とは、収縮期血圧130mmHg～139mmHg、または拡張期血圧85mmHg～89mmHgのことです。

Check

- ☐ あっさりよりこってり
- ☐ 味が濃いメニューを選びがち
- ☐ つい甘いものを食べてしまう
- ☐ 肉ばかりで野菜少なめ

食生活の改善に
プラスして

生活習慣が気になり始めた方の健康緑茶は
4つの機能を兼ね備えた
機能性表示食品の粉末緑茶です。

高めの血圧
ヒハツ由来ピペリンの研究報告

食後血糖値
難消化性デキストリンの研究報告

食後中性脂肪
難消化性デキストリンの研究報告

おなかの調子
難消化性デキストリンの研究報告

【機能性関与成分の研究報告】

詳しくは薬剤師又は登録販売者にご相談下さい