

ツムラの漢方製剤
ツムラ漢方桂枝加朮附湯エキス顆粒

「桂枝加朮附湯」は、『吉益東洞』という江戸時代の医師が考案した漢方薬で、主に四肢の関節が痛んだり腫れたりして動かしにくい「関節痛」、「神経痛」に用いられています。
『ツムラ漢方桂枝加朮附湯エキス顆粒』は、「桂枝加朮附湯」から抽出したエキスより製した服用しやすい顆粒です。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
むくみ
 - (7) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
* その他	動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

●効能・効果

体力虚弱で、汗が出、手足が冷えてこわばり、ときに尿量が少ないものの次の諸症：
関節痛、神経痛

●用法・用量

次の量を、食前に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15 歳以上)	1 包(1.875g)	2 回
7 歳以上 15 歳未満	2 / 3 包	
4 歳以上 7 歳未満	1 / 2 包	
2 歳以上 4 歳未満	1 / 3 包	
2 歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

●成分・分量

本品 2 包(3.75g) 中、下記の割合の混合生薬の乾燥エキス 1.875g を含有します。

日局ケイヒ…………… 2.0g	日局カンゾウ…………… 1.0g
日局シャクヤク…………… 2.0g	日局ショウキョウ…………… 0.5g
日局ソウジュツ…………… 2.0g	日局ブシ末…………… 0.25g
日局タイソウ…………… 2.0g	

添加物として日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物を含有します。

●保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用してください。
4. 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を用いた製品ですので、製品により多少顆粒の色調等が異なることがあります効能・効果にはかわりありません。
5. 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

お問い合わせ先

本製品内容について、何かお気付きの点がございましたら、
ご購入めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

製造販売元



お客様相談窓口
電 話 0120-329-930
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)
<https://www.tsumura.co.jp/>