

HapYcom

口唇炎・口角炎治療薬

# リップキュアLP

5つの有効成分配合

リップ

ビタミン

E

ビタミン

B6

アラントイン  
グリチルレチン酸  
パンテノール  
配合

# 口唇炎 口角炎


口唇のひびわれ・ただれ

第3類医薬品

ぬりやすい  
ドーム型ヘッド



## 医薬品のリップクリーム



HapYcom ハピコム

第3類医薬品

口唇炎・口角炎治療薬

# リップキュアLP

HapYcom ハピコム

第3類医薬品

# リップキュアLP

1日数回、適量を患部に塗布

クリームの色：白色



# 口唇炎・口角炎

口唇のひびわれ・ただれ

第3類医薬品 口唇炎・口角炎治療薬

# リピキュアLP

5つの有効成分が唇のひびわれ、口角炎を治します

ビタミンE

ビタミンB6

アラントイン

グリチルレチン酸

パンテノール



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 湿潤やただれのひどい人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

ステロイド無配合のクリームです

A1

開封口

製造販売元

ジャパンメディック株式会社

富山県富山市横越168

お客様相談窓口 ☎076-438-1107

受付時間：月～金 9:00～17:00

(祝日・年末年始を除く)

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

効能・効果

口唇のひびわれ、口唇のただれ、口唇炎、口角炎

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

成分・分量(100g中)

アラントイン	0.5g
グリチルレチン酸	0.3g
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE酢酸エステル)	0.2g
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	0.1g
パンテノール	0.5g

添加物として、流動パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、ワセリン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、セタノール、硬化油、パラベンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。  
また、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用してください。

※ 冬季など気温の低い時に中身が硬くなり、チューブから出にくくなる場合があります。手で温めてからご使用ください。

※ ご使用後は、チューブの口元をきれいにふいてください。