

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

第2類医薬品

スットノーズαプラス点鼻薬DX〈季節性アレルギー専用〉

季節性アレルギー専用点鼻薬

- 抗炎症・抗アレルギー成分「ベクロメタゾンプロピオン酸エステル」が花粉によるつらい鼻づまりや鼻水、くしゃみをおさえます。
- 殺菌消毒成分「ベンゼトニウム塩化物」配合。
- l-メントール+ハッカ油配合（添加物/清涼化剤）でスッキリクールな使い心地。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 次の診断を受けた人。
全身の真菌症、結核性疾患、高血圧、糖尿病、反復性鼻出血、ぜんそく、緑内障、感染症
- (2) 鼻孔が化膿（毛根の感染によって、膿（うみ）がたまり、痛みやはれを伴う）している人。
- (3) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 18才未満の人。
- (5) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (6) ステロイド点鼻薬を過去1年間のうち3ヵ月以上使用した人。

2. 本剤は、他のステロイド点鼻薬の使用期間も合わせて、1年間に3ヵ月を超えて使用しないでください（3ヵ月を超えた使用が必要な場合には、他の疾患の可能性があるので耳鼻咽喉科専門医に相談してください）

3. 本剤の使用後は、ステロイド点鼻薬を使用しないでください。ただし、医師から処方された場合は、その指示に従ってください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。
- (3) 頭、額や頬などに痛みがあり、黄色や緑色などの鼻汁のある人（感染性副鼻腔炎）。
- (4) 授乳中の人。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 季節性アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。
- (7) 高齢者。
- (8) 肥厚性鼻炎*1や鼻たけ（鼻ポリープ）*2の人。
※1：鼻のまわりが重苦しく、少量の粘液性又は黄色や緑色の鼻汁がでる。
※2：鼻づまり、鼻声、鼻の奥の異物感などがある。
- (9) 長期又は大量の全身性ステロイド療法を受けている人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
鼻	鼻出血、鼻の中のかさぶた、刺激感、かゆみ、乾燥感、不快感、くしゃみの発作、嗅覚異常、化膿症状（毛根の感染によって、膿（うみ）がたまり、痛みやはれを伴う）
のど	刺激感、異物感、化膿症状（感染によって、のどの奥に白っぽい膿（うみ）がたまり、痛みやはれを伴う）
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
精神神経系	頭痛、めまい
消化器	吐き気・嘔吐、下痢、食欲不振
その他	ぜんそくの発現、目の痛み、目のかすみ、動悸、血圧上昇

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 使用後、頭、額や頬などに痛みがでたり、鼻汁が黄色や緑色などを呈し、通常と異なる症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください（他の疾患が併発していることがあります）
4. 1週間位（1日最大4回（8噴霧）まで）使用しても症状の改善がみられない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

花粉による季節性アレルギーの次のような症状の緩和：鼻づまり、鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ

【用法・用量】

通常、次の量を左右の鼻腔内に噴霧してください。

年 令	1回量	1日使用回数
成人（18才以上）	左右の鼻腔内にそれぞれ1度ずつ噴霧	2回（朝・夕）
18才未満	使用しないこと	

1日最大4回（8噴霧）まで使用してもかまいませんが、使用間隔は3時間以上おいてください。

・症状が改善すれば使用回数を減らしてください。症状が再び悪化した場合は、使用回数を増やしてもかまいません。

・1年間に3ヵ月を超えて使用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 本剤はベクロメタゾンプロピオン酸エステル（ステロイド）を配合していますので、過量に使用したり、間違った使用方法で使用すると、副作用が起こりやすくなる場合がありますので、定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 点鼻用にのみ使用してください。

(3) 使用時に味がした場合には口をゆすいでください。

（使用方法）

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 
鼻孔が化膿している人は使用できません。	使用前にやさしく鼻をかみ、鼻腔の通りをよくしてください。（あまりきつくかまないでください）	容器をよく振ってからキャップをはずし、図のように容器を持ってください。（使い初めは薬液が霧状に出るまで数回空押しをしてください）	ノズルの先を軽く鼻腔内に入れ、1回に1度ずつ薬液を噴霧してください。もう一方の鼻腔でも同じ操作を繰り返してください。	使用後は容器を清潔に保つため、ノズル付近を清潔なティッシュペーパーなどでふいてからキャップをしてください。

（使用にあたっての注意）

(1) 容器を横にして使用すると、薬液が霧状にならないので、必ず垂直にして使ってください。

(2) 容器の先が鼻汁などに触れると、薬液が汚染されることがあるので注意してください。

(3) ノズルが鼻中隔*に向かないよう、鼻腔内にまっすぐに入れて噴霧してください。特に右利きの方では右の鼻中隔に、左利きの方は左の鼻中隔に向きやすいため注意してください。

*鼻中隔：鼻の穴の中にある鼻腔を左右に仕切る隔壁

(4) ノズルの先端はすでに小さな穴があいておりますので、針などで突くのはおやめください。

【成分・分量】100g中

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル……100mg、ベンゼトニウム塩化物……19mg

添加物：プロピレングリコール、セルロース、カルメロースNa、ポリソルベート80、クエン酸、l-メントール、ハッカ油

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わるのを防ぐため）

(4) 他の人と共用しないでください。

(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

また開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願いいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

電話06-6351-2100（代表） 受付時間 9:00～17:00（土日祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
フリーダイヤル 0120-149-931

製造販売元



奥田製薬株式会社

大阪市北区天満1丁目4番5号

<https://www.okudaseiyaku.co.jp/>