

✂ 切り取り線

Kracie

48錠

漢方セラピー しみ、ニキビを体の中から改善したい方に



桂枝茯苓丸料加薏苡仁  
ケイ シ ブクリョウガンリョウ カ ヨク イ ニン

T-92

【効能】

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭痛、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：にきび、しみ、手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎）、月経不順、血の道症

【注】「血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状を指します。

【用法・用量】

1日2回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

| 年齢        | 1回量     | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人(15才以上) | 4錠      | 2回     |
| 15才未満7才以上 | 3錠      |        |
| 7才未満5才以上  | 2錠      |        |
| 5才未満      | 服用しないこと |        |

【用法・用量に関連する注意】

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させていただきます。

【成分】

成人1日の服用量8錠(1錠342mg)中  
桂枝茯苓丸料加薏苡仁エキス粉末…1,800mg  
【ケイヒ・ブクリョウ・ポタンピ・トウニン・シャクヤク各2.0g、  
ヨクイニン5.0gより抽出。】

添加物として、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、セルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、カルナウバロウを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりとめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

発売元

製造販売元

クラシエ 薬品株式会社 クラシエ株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080) 東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334  
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先 ☎0120-149-931

✂ 切り取り線

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

チャック

【クラシエ】漢方桂枝茯苓丸料加薏苡仁エキス錠  
漢方製剤 ケイシブクリョウガンリョウカヨクイニン

△ 使用上の注意

☞ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
    - (1) 医師の治療を受けている人
    - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
    - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
    - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
  2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症状        |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器  | 食欲不振      |
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
  4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



PE, 金属

製造番号

使用期限

H02-S 1