

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

麦門冬湯エキス錠クラシエ

(バクモンドウトウ)

特 徴

- 「麦門冬湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書「金匱要略」キン キ ヨウリヤクに収載されている薬方です。
- たんが切れにくく、のどにからんだりするときのせきや気管支炎に効果があります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 水様性の痰の多い人
 - (4) 高齢者
 - (5) 次の症状のある人
むくみ
 - (6) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるの
で、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空 せき、発熱等がみられ、これらが急に あらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感や こわばりに加えて、脱力感、筋肉痛が あらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目 が黄色くなる)、褐色尿、全身のだる さ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位 (からぜきに服用する場合には1週間位) 服用しても症
状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談し
てください

効 能

体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ、又は咽
頭の乾燥感があるものの次の諸症：からぜき、気管支炎、気管支ぜん
そく、咽頭炎、しわがれ声

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	6錠	3回
15才未満7才以上	4錠	
7才未満5才以上	3錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分

成人1日の服用量18錠(1錠200mg)中、次の成分を含んでいます。

麦門冬湯エキス(1/2量).....2,000mg

カンソウ・ニンジン各1.00g、コウベイ・ハング各2.50g、タイソウ1.50g、バクモンドウ5.00gより抽出。

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ステアリン酸Mg、メタケイ酸アルミン酸Mgを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(ビン包装の場合は、密栓して保管してください。なお、ビンの中
の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓
後は不要となりますので捨ててください。)
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質
が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありま
すので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。
- (6)6錠分包の場合、1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折
り返して保管してください。なお、2日を過ぎた場合には服用しな
いでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<https://www.pmda.go.jp/>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店
又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元 **クラシエ 薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

製造販売元 **クラシエ株式会社**
東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)