

この台紙は、服用の際にはよく読み、大切に保管してください。

ビタミン含有保健薬 キューピーコーワゴールドαプレミアム

第3類医薬品

△使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢

4. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この台紙を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

●効能・効果/滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

●用法・用量/下記の量を水又は温湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1錠	1～2回
15歳未満の小児	× 服用しないこと	

※朝・昼・晩、食前・食後にかかわらず、いつでも服用できます。(1日2回服用する場合は、1回目の服用から6時間以上間隔をあけられることをおすすめします。)

(用法・用量に関連する注意)用法・用量を厳守してください。

●成分・分量(2錠中)/トチュウ乾燥エキス14.0mg(トチュウとして200mg)、シャクヤク乾燥エキス17.1mg(シャクヤクとして120mg)、エゾウコギ乾燥エキス14.0mg(エゾウコギとして350mg)、オウギ乾燥エキス30.0mg(オウギとして240mg)、オキソアミジン末50.0mg、L-アルギニン塩酸塩50.0mg、チアミン硝酸塩(V.B₁)10.0mg、リボフラビン(V.B₂)4.0mg、ピリドキシン塩酸塩(V.B₆)10.0mg、トコフェロールコハク酸エステルカルシウム20.7mg[dl-α-トコフェロールコハク酸エステル(V.E)として20mg]、L-アスコルビン酸ナトリウム112.6mg

[L-アスコルビン酸(V.C)として100mg]、無水カフェイン50.0mg(添加物)セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、タルク、アラビアゴム、炭酸Ca、白糖、ゼラチン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、リン酸水素Na、酸化チタン、黄色五号、カルナウバロウ

<成分・分量に関連する注意>ビタミンB₂(リボフラビン)により、尿が黄色になることがあります。

●保管及び取扱い上の注意/(1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じたりすることがありますので、水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。(5)容器のキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合がありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。

(6)容器の落下等の衝撃により錠剤に亀裂が入り、品質に影響を与えることがありますので、取扱いに注意してください。(7)ラベルの「開封年月日」記入欄に、キャップをあけた日付を記入してください。(8)使用期限(台紙及び容器に記載)をすぎた製品は服用しないでください。また、一度キャップをあけた後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安に服用してください。

お問い合わせ先 興和(株)お客様相談センター
TEL 03-3279-7755
月～金(祝日を除く)9:00～17:00

副作用被害救済制度
☎0120-149-931



A

◀開け口

Kowa

製造 興和株式会社
販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

EOK