

**商品の特長**

- ここちよい温感の(微香性)鎮痛消炎温感シップ剤。
- 薄く軽いので、使用部位にしっかりと密着。
- シップの角を丸くすることで衣類に引っかからず、はがれにくくなりました。
- 伸縮自在で、関節部位にもぴったりフィット。
- フィルムがはがしやすく、貼りやすいシップです。
- 1枚ずつ取り出しありやすくてコンパクトな包材の「ポケシップ」です。

**薄く
軽い**

丸かどシップ®

貼りやすい

⚠ [使用上の注意]**☒ してはいけないこと** [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

⚑ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み、色素沈着 |
3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】腰痛、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、しもやけ**【用法・用量】**1日1~2回患部に貼付してください。**〈用法・用量に関する注意〉**

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (3) 強い刺激を感じることがありますので、入浴の1時間前には本剤をはがしてください。
また、入浴後は30分位してから使用してください。
- (4) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
- (5) 皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。
- (6) 打撲、ねんざ等に本剤を使用する場合は、はがひいてから使用してください。

【成分・分量】

成分	含量(膏体100g中)
サリチル酸グリコール	2.0g
トコフェロール酢酸エステル	1.0g
l-メントール	1.0g
トウガラシエキス	0.3g

添加物として、イソプロピルメチルフェノール、エドト酸ナトリウム、グリセリン、ケイ酸アルミニウム、香料、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルベートール、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4)ご使用後は中身の乾燥を防ぐためしっかりとシールを閉めてください。

《包 装》10cm × 14cm 10枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 烏栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：TEL.0120-133250 受付時間／9:00—17:50（土日・祝日・会社休日を除く）