

乗物酔いに**スーツ**と効く

出発前
でも

酔ってから
でも

パンシロン トラベルSP



口の中でサッと溶ける
爽やかラムネ味

第2類医薬品



7才
以上
大人の方まで



ロート製薬

■保管及び取り扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かないところに保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わる)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても一度内袋を開封した後は、なるべく早くご使用ください。

お客さま安心サポートデスク

東京: 03-5442-6020 大阪: 06-6758-1230 受付時間 9:00~18:00 (土、日、祝日を除く)



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり
副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)高齢者(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(5)次の症状のある人 排尿困難(6)次の診断を受けた人 緑内障、心臓病、フェニルケトン尿症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

■用法・用量

本剤はチュアブル錠ですので、乗物酔いの予防には乗車船30分前、あるいは乗物に酔ったときにかむか、口中で溶かして服用してください。なお、追加服用する場合には、1回量を4時間以上の間隔をおき服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15才以上	2錠	2回まで
7才～14才	1錠	
7才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(3)チュアブル錠の取り出し方：図のようにチュアブル錠の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。またPTPシートは1錠ずつ切り離さないでください。(誤ってそのまま飲み込んでしまうと食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



乗物酔い薬

第2類医薬品

■ 効能・効果 乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

■ 成分・分量(2錠中)

塩酸メクリジン…25mg、スコポラミン臭化水素酸塩水和物…0.25mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)…6mg

添加物：セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、無水ケイ酸、カラメル、オレンジ油、

l-メントール、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、香料、ステアリン酸Mg、炭酸Mg

水なしで飲める

