

ROHTO<sup>®</sup>

医薬品

# 口角炎・ 口唇炎に

ガサガサ

皮むけ

ひびわれ

6つの有効成分が  
荒れた唇をしっかりと治療

## 口唇炎・口角炎治療薬

医薬品

修復

血行促進

代謝促進

抗炎症

殺菌作用

清涼成分

アラント  
イン

ビタミンE  
誘導体

ビタミン  
B6

グリチル  
レチン酸

セチル  
ピリジニウム  
塩化物水和物

dL-  
メントール

## メンソレータム<sup>®</sup> メディカルリップ



無香料・無着色

メントール配合

第3類医薬品

無香料・無着色

メントール配合

販売名

メンソレータム®メディカルリップb

第3類医薬品

6つの有効成分で荒れた唇をしっかりと治療して、しっとりなめらかに。

- アラントイン……………荒れた唇の修復を促進。
- ビタミンE誘導体…血行を促進し、口唇炎による荒れに効果的。
- ビタミンB6……………皮膚の新陳代謝を促進。
- グリチルレチン酸…唇の炎症を抑える。
- セチルピリジニウム塩化物水和物……………殺菌作用。
- dl-メントールでスーッと爽やかな清涼感。

#### 【使用上の注意】

##### ●相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。皮フ: 発疹・発赤、かゆみ
3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】 口唇のひびわれ、口唇のただれ、口唇炎、口角炎

【用法・用量】 1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉 (1) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること。  
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3) 口唇への外用にのみ使用すること。

【有効成分】 トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体)0.2%、dl-メントール0.5%、グリチルレチン酸0.3%、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)0.1%、アラントイン0.5%、セチルピリジニウム塩化物水和物0.1% ※添加物として、シヨ糖脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、流動パラフィン、セタノール、サラシミツロウ、パラフィン、グリセリン、パラベン、BHT、パルミチン酸デキストリン、ジメチルポリシロキサンを含有する。

【保管及び取り扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。

※冬期など気温が低いときに製剤が硬くなって取りにくいときは、常温で温めてからご使用ください。

MADE IN JAPAN

ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

お問合せ先:お客さま安心サポートデスク

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230  
受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)