

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。〈目薬〉

販売名:ロートCキューブプレミアムクリア

第3類医薬品



ロートCキューブ® PREMIUM CLEAR

プレミアムクリア

コンタクトなどによる
疲れダメージ修復
ビタミンA配合

特 長

コンタクト疲れの根本原因にWのアプローチで効く

コンタクトなどによる
角膜の傷^{*}を修復
●ビタミンA

ピント調節筋の
コリをほぐす
●ネオスチグミンメチル硫酸塩

- ◆ 角膜ダメージ保護 …………… コンドロイチン硫酸エステルナトリウム
- ◆ 栄養補給 …………… タウリン/天然型ビタミンE

※コンタクトなどによる軽度なこすれ

目薬には、ソフトコンタクトレンズ装用中に使用できるものと使用できないものがあります。ソフトコンタクトレンズを装用したまま目薬を使用する場合は、外箱や添付文書を確認し、必ず、ソフトコンタクトレンズ装用中に使用できる目薬を使用しましょう。

- **すべてのコンタクトレンズ装用中に使えます。また、レンズをはずした後にもご使用いただけます。** (カラーコンタクトレンズ装用中には使用しないでください。)

ソフト

ハード

O₂

使い捨て

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる

フリーアングルノズル®

簡単にアイケアできて、とっても便利です。



キャップの開閉方法

容器のわきをもち、キャップ部分を上にして、開閉してください。

※容器の中央部分だけを持って開閉すると、薬液がとびだしてもれることがあります。

キャップの開け方

キャップを手前にひねってください。



キャップの閉め方

カチッと音がするまで押し下げてください。



△ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。
…はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。
…緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5~6日間使用しても症状がよくなる場合

用法・用量

1回1~3滴、1日5~6回点眼してください。

— 用法・用量に関連する注意 —

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
[汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因となる]また、
混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用にのみ使用してください。
- (4) コンタクトレンズを装着していないときも使用できます。



効能・効果

目の疲れ、ソフトコンタクトレンズまたはハードコンタクトレンズを装着している時の不快感、目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)

成分

ネオスチグミンメチル硫酸塩(ピント調節機能改善成分).....0.005%
レチノールパルミチン酸エステル(ビタミンA).....30,000単位/100mL
酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE).....0.05%
タウリン.....1%
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(角膜保護成分).....0.1%

添加物: 塩化Na、ホウ酸、ホウ砂、ポビドン、 β -メントール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、
ポリオキシエチレンヒマシ油、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、
エデト酸Na、ピロ亜硫酸ナトリウム、塩酸ポリヘキサニド、pH調節剤

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、保管及び取扱い上の注意に従い、1~2ヶ月を目安にご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

401965801