

P

P

C

〈用法用量に関連する注意〉

- (1)用法用量を厳守してください。
- (2)顔面など皮ふの敏感な個所に適用する場合には、はじめは低濃度から開始してください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5)外用にのみ使用してください。

〔成分分量〕

過酸化水素 (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) 2.5 ~ 3.5 w/v% を含有します。

添加物：フェナセチン、リン酸

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない冷所 (30℃以下) に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5)保存中に瓶内の圧力が高くなっていることがありますので、瓶口を顔にむけぬようにして、キャップをあけてください。

〈貯法〉

気密容器。遮光して 30℃以下で保存。


副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

外用殺菌消毒薬

第3類医薬品

日本薬局方

# オキシドール



 **健栄製薬株式会社**  
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号  
電話番号 06(6231)5626

きずの消毒・洗浄に

使用に際しては、説明書きをよく読んで下さい。

 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)患部が広範囲の人。
- (4)深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5 ~ 6 日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能効果〕 きずの消毒・洗浄

〔用法用量〕

そのままの液又は2~3倍に水でうすめた液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部を洗ってください。

第3類医薬品

日本薬局方

# オキシドール

~30°

つぶして廃棄  
しやすい  
減容ボトル

