

第3類医薬品

ケンエ 健栄製薬

アズレンE うがい薬



お口やのどの
はれ、殺菌・消毒に

W 処方

抗炎症

アズレンスルホン酸
ナトリウム水和物

殺菌

セチルピリジニウム
塩化物水和物

便利な計量カップ付き

さわやかメントール味

ご使用に際して、外箱の説明文を
必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に
保存してください。



第3類医薬品

販売名：アズレンEうがい薬®

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してください
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こした
ことがある人。
(3) 口内のひどいただれのある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作
用の可能性があるため、直ちに使用を中止
し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬
剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
口	刺激感

- 5～6日間使用しても症状がよくなる
ない場合は使用を中止し、この外箱を持
って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販
売者に相談してください

効能効果

口腔・咽喉のはれ、口腔内及びのどの殺菌・
消毒・洗浄、口臭の除去

用法用量

- 1 回約10滴（約0.4mL）を水又は微温水約
100mLに薄めて、1日数回うがいしてください。
〈用法用量に関連する注意〉
(1) 用法用量を厳守してください。
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導
監督のもとに使用させてください。
(3) うがい用にのみ使用してください。
(4) 使用のつど希釈し、希釈後は早目に使用し
てください。
(5) 原液のまま使用しないでください。

成分分量

100mL中 アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物0.5g、セチルピリジニウム塩化物水和
物1.25g含有
添加物：L-メントール、エタノール、リン酸
水素ナトリウム水和物、pH調整剤

保管及び取扱い上の注意


- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して
保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わること
があります。）
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでくだ
さい。
- 火気に近づけないでください。

®登録商標

使用法



- ① キャップをはずして容器
を逆さに持ち、指でゆっ
くり押し、計量カップに
約10滴（約0.4mL）を
とります。



- ② 100mLの目盛まで
水又は微温水を加え
て薄めてから、数回
うがいしてください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

健栄製薬(株)お問い合わせ先
電話番号(06)6231-5822
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ケンエ 健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号