

服用に際しては、説明書をよく読んでください。

飲みすぎ・二日酔のむかつきに

大正漢方胃腸薬〈内服液〉

大正漢方胃腸薬〈内服液〉

第2類医薬品

⚠【使用上の注意】

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。
症状の名称：腸間膜静脈硬化症
症状：長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能】

飲みすぎ、はきけ（二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心）、食欲不振、消化不良、胃部・腹部膨満感、胃弱、食べすぎ、胸やけ、もたれ、胸つかえ、嘔吐

【用法・用量】

成人（15才以上）1回1びん1日3回食前又は食間に服用してください。（食間の服用は、食事の後2～3時間を目安にします）

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は、生薬成分を含むため、経時的に沈殿いたしますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

【成 分】 1本（30mL）中

五苓散料水製乾燥エキス…………… 0.3g
（タクシャ0.833g、ブクリョウ0.750g、ケイヒ0.500g、チョレイ0.750g、ビャクジュツ0.750gに相当）
黄連解毒湯水製乾燥エキス…………… 0.3g
（オウレン0.333g、オウバク0.333g、オウゴン0.500g、サンシシ0.333gに相当）
添加物：白糖、D-ソルビトール、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、ポリソルベート80、エタノール、その他2成分

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (4)本剤は1回1本飲みきりですので、封をあげたら飲みきってください。封をあげたまま保存しないでください。

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

発売元 大正製薬株式会社⁶¹
東京都豊島区高田3丁目24番1号
お客様119番室 電話03-3985-1800
製造 ジェーピーエス製薬株式会社
販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

——本文は、直接ラベルに記載されている事項です——