

第3類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



う が い 薬

ラリンゴールは…

ラリンゴール®

のどの痛み・はれに

- のどの炎症による痛み・はれをやわらげるうがい薬です。
- 濃いグリーンとうがい薬で、爽快な使用感があります。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
次の症状のある人。

口内のひどいただれ

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
口	刺激感


3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

【効 能】

- のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ
- 口内の洗浄
- 口臭の除去

【用法・用量】

通常1回2～3振り(約0.5mL)をコップ半量(約100mL)の水にうすめてうがいします。1日3～5回うがいします。



〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)うがい用にのみ使用してください。(内服や眼科用として使用しないでください。)

〔成分・分量と働き〕100mL中

成 分	分 量	働 き
ミルラチンキ	1,000mg	痛みを止め、はれを抑えます。
ラタニアチンキ	400mg	収れん作用により炎症を抑えます。
サリチル酸フェニル	600mg	防腐、殺菌作用があります。
チモール	100mg	殺菌作用があります。

添加物として、クエン酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、プロピレングリコール、ラウリル硫酸Na、アルコール、黄色5号、青色1号、香料(ウイキョウ油、l-メントールを含む)を含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用後はノズル付近をティッシュ等で拭き取り、清潔にしてからキャップをしっかりとめてください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



◎このようなときにお使いください

- かぜや扁桃炎などでのがりが痛いとき、はれているときに。
- のどを使いすぎて炎症を起こしているときに。
- タバコの吸いすぎなどでのがりがらっぽいときに。
- 口の中がネバネバするときに。
- 口臭が気になるときに。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号