

まきょうかんせきとう
サンワ 麻杏甘石湯 エキス細粒「分包」

サンワ麻杏甘石湯エキス細粒「分包」は、漢方処方「麻杏甘石湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある
ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱ り感やこわばりに加えて、脱力 感、筋肉痛があらわれ、徐々に 強くなる。

3. 1ヵ月位（感冒に服用する場合には5～6日間）服用しても
症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医
師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談
すること

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	1 包
7才～14才	2/3 包
4才～ 6才	1/2 包
2才～ 3才	1/3 包
2才 未 満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに
服用させること。

成 分

本品1日量 …… 3包（1包 2g）中
麻杏甘石湯水製エキス …… 1.8g

マ オ ウ ……	3.2 g
キ ョ ウ ニ ン ……	3.2 g
カ ン ゾ ウ ……	1.6 g
セ ッ コ ウ ……	8.0 g
上記の生薬より抽出したエキス	

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管する
こと。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり
品質が変わる。）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返
して保管し、2日以内に服用すること。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
又は下記にお願い申し上げます。

*消費者くすり相談室 TEL 0570-095770
10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が
異なることもございますが、効能・効果には変わりございま
せん。

適応症

体力中等度以上で、せきが出て、ときにのどが渇くものの次の
諸症：

せき、小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、感冒、痔
の痛み



三 和 生 薬 株 式 会 社
栃木県宇都宮市平出工業団地6-1