

## サンワロン K 顆粒

けいしかじゅうぶとう  
桂枝加朮附湯による

サンワロン K 顆粒は、漢方処方「桂枝加朮附湯」の水製エキスを服用しやすい顆粒の分包にしたものです。



## 使用上の注意



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。
    - むくみ
  - 次の診断を受けた人。
    - 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	動悸、のぼせ、ほてり

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つ ばり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、 徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	1～2 包
15才 未 満	服用しないこと

## 成 分

本品1日量 …… 6包（1包 0.75g） 中  
サンワロンK水製エキス …… 2.4g

ケイヒ …… 2.4g	ショウキョウ …… 0.6g
シャクヤク …… 2.4g	カンゾウ …… 1.2g
タイソウ …… 2.4g	ソウジュツ …… 2.4g

加工ブシ末 …… 0.6g

添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖、ステアリン酸Caを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

## ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室  
東京都千代田区外神田 6-6-1  
TEL 03-3834-2171（代）  
（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

## 適応症

体力虚弱で、汗が出、手足が冷えてこわばり、ときに尿量が少ないものの次の諸症：

関節痛、神経痛

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三和生薬株式会社  
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1