2013年5月改訂（記載要領変更による）

第2類医薬品

ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

品番 322

補中益気湯（ほちゅうえっきとう）A エキス細粒「分包」 三和生薬

補中益気湯Aエキス細粒「分包」三和生薬は、漢方処方「補中益気湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。

使用上の注意

相談すること

1．次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
　むくみ
(6) 次の診断を受けた人。
　高血圧、心臓病、腎臓病

2．服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする･息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり､持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ､食欲不振等があらわれる。

3．1ヵ月位（感冒に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4．長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

適応症

体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症：
虚弱体質、疲労倦怠、病後･術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年令	1回量
大人（15才以上）	1包
7才～14才	2/3包
4才～6才	1/2包
4才未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分

本品1日量 …… 3包（1包2.0 g）中
補中益気湯エキス（7/10量） …… 3.7 g

ニンジン	2.80 g	タイソウ	1.40 g
ビャクジュツ	2.80 g	ショウキョウ	0.35 g
オウギ	2.10 g	サイコ	1.40 g
トウキ	2.10 g	カンゾウ	1.05 g
チンピ	1.40 g	ショウマ	0.70 g

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。
(3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社　消費者くすり相談室
東京都千代田区外神田6-6-1
ＴＥＬ　03-3834-2171（代）
（月～金曜日　10：00～17：00　但し祝日を除く）

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。

三和生薬株式会社
栃木県宇都宮市平出工業団地6-1

SE