

りょうけいじゅつかんとう

苓桂朮甘湯 A エキス細粒「分包」 三和生薬

苓桂朮甘湯Aエキス細粒「分包」三和生薬は、漢方処方「苓桂朮甘湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---------------------|---|
| 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感 やこわばりに加えて、脱力感、筋 肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

| 年 令 | 1 回 量 |
|-----------|---------|
| 大人（15才以上） | 1 包 |
| 7才～14才 | 2/3包 |
| 4才～6才 | 1/2包 |
| 4才未満 | 服用しないこと |

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品1日量 …………… 3包（1包1.5g）中
苓桂朮甘湯エキス …………… 1.7g

| | |
|--------|----|
| ブクリョウ | 6g |
| ケイヒ | 4g |
| ビャクジュツ | 3g |
| カンゾウ | 2g |

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室
東京都千代田区外神田6-6-1
TEL 03-3834-2171（代）
（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

適応症

体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症：

立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、神経症、神経過敏

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三和生薬株式会社
栃木県宇都宮市平出工業団地6-1