

ご使用前に、この箱の説明文をお読みください。
また必要な時に読めるように保管してください。

作成日：平成 29 年 3 月 23 日

添付文書-ひ 40-r01

平成 29 年 3 月作成

第 2 類医薬品

コトブキ浣腸ひとおし 40

(情報は小箱に直接記載)

[使用上の注意]

してはいけないこと

連用しないこと (常用すると、効果が減弱し (いわゆる“なれ”が生じ) 薬剤にたよりがちになる。)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
- (3) 高齢者。
- (4) はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血のある人。
- (5) 心臓病の診断を受けた人。

2. 2～3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意

次の症状があらわれることがある

立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感

[効能・効果] 便秘

[用法・用量]

12歳以上1回1個(40g)を直腸内に注入します。
それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんすること。
(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがある。)
- (3) 12歳未満の小児には使用させないこと。
- (4) 浣腸にのみ使用すること。
- (5) 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
- (6) 冬季は容器を温湯(40℃)に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。

【使用方法】

- ① 首部を持ち、キャップを静かに外してください。
- ② 挿入部に傷等がないか確かめて、肛門部に挿入し、容器を静かに押しつぶしながら、ゆっくりと薬液を注入してください。
- ③ 薬液注入後、2～5分がまんして十分便意が強まってから排便してください
挿入部分が長く(当社比)容器は押しつぶしやすいジャバラ式ですので、力の弱いお年寄りの方にも、より使いやすくなりました。

滑らかに挿入できない場合は、薬液を少し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。



[便秘しがちな方のために](小箱に記載なし)

1. 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけてください。
また、便意をもよおした時は、がまんせずトイレに行ってください。
2. 繊維質の多い食べ物と水分を多くとるように心がけてください。
(例：野菜類・果物・コンニャク・カンテン・海藻等)
3. 適度な運動、腹部マッサージ等を行うよう心がけてください。
4. 早朝、起きがけに冷たい水または牛乳等を飲むと、便意をもよおしやすくなります。

【成分・分量】本品1個(40g中)

日局 グリセリン20.0g

添加物として ベンザルコニウム塩化物含有
溶剤として精製水

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)

【包装】40g×2個入、40g×10個入

お問合せ先 ムネ製薬株式会社 お客様相談室

電話番号：0120-85-0107

受付時間：8:30～17:00(土日祝を除く)

製造販売元  ムネ製薬株式会社

兵庫県淡路市尾崎 859

<http://www.mune-seiyaku.co.jp>

40 g enema

<Composition>

Each 40g contains 20g of glycerin(JP)and benzalkonium chloride as an additive.

<Dosage and Administration>

For patients over 12 years of age, one unit(40g) at a time is administered rectally.
If this dosage does not relieve constipation,the same dosage can be administered again.

<Indications>

Constipation

Made in Japan